



전음성 난청

출처:



전음성 난청



어느 가족의 이야기



원인과 치료

- 소리는 외이에 모여 이도를 따라 고막으로 이동합니다. 고막은 소리의 파동에 반응하여 움직이고 진동합니다.
- 이러한 고막의 운동은 중이에 있는 세 개의 뼈(추골, 침골, 등골)를 통해 내이의 출입구(난원창)로 전달되는 연쇄 반응을 일으킵니다.
- 전음성 난청(CHL)의 원인은 외이 또는 중이의 어느 부분에 존재하는 불규칙성 때문입니다. 소리가 그러한 영역에서 전도되지 않아서 난청이 발생하게 됩니다.
- CHL은 외이 또는 중이 구조 가운데 한 부분의 감염, 비정상적 성장 또는 기형으로 인해 발생하기도 합니다.
- CHL은 아주 가벼운 수준에서 증증까지 나타날 수 있습니다.
- 일시적 또는 영구적 CHL은 유아의 듣기와 말하기 능력에 큰 영향을 줄 수 있기 때문에 최대한 빠른 검사와 치료가 필요합니다.
- CHL은 약물이나 수술, 보청기나 BAHA 착용 등 의학적 치료로 해결되는 경우가 많습니다.
- 소아 청력 전문가는 성인보다는 특히 어린이 대상 교육을 받기 때문에 CHL이 있는 아동의 지원에 적합합니다.

