



# 不仅仅是听力损失

## 资料来源:



手和声音



辛辛那提儿童医院



聋人加

### 当孩子有听力损失以外的其他诊断时，需要考虑什么因素：

- 超过40%的耳聋/重听（d/hh）儿童患有其他健康问题或发育迟缓。
- 这些其他的诊断可能包括精神健康问题、学习障碍、失明、脑瘫和其他需求。
- 导致其他残疾和/或诊断的因素可能与引起听力损失的因素（遗传、疾病等）相同，或者与导致听力损失的因素完全无关。
- 患有其他诊断的耳聋/重听患者有时被称为有其他症状的聋人或有其他残疾的聋人。
- 对于专业人员来说，有时难以区分听力损失和其他残疾，这使得进行评估、干预和/或教育安置更为困难。
- 听力损失和其他健康或发育诊断的综合出现会使得对其中任何一种诊断的干预变得更为困难，因为每种诊断（和每个人）都会具有其自身的障碍和需求。
- 对于从事失聪残疾儿童工作的人来说，了解一个孩子的所有残疾情况是很重要的，即使这种要求可能不适用于每位专业人士。这样，各专业人士可意识到这些综合因素可影响到他们努力实现的目标。例如，对于儿童的物理治疗师来说，知道这些儿童存在耳聋/重听情况是很重要的，这样治疗师就可以有效地进行交流；与此同时，对于听力学家来说，了解儿童的运动。延迟是很重要的，这样能够便于他们提供无障碍便利并配合利用儿童独特的运动能力。
- 其他残疾会给耳聋/重听儿童在听和交流方面造成困难。每个家庭都应该考虑所有的交流方式，并决定何种方式最适合孩子。有时，一个孩子可能会使用不同的交流方式来表达和接收语言。

11.23 more than HL